








# Enquête antibiothérapie

OMEDIT Haute-Normandie

Comparaison des antibioprophylaxies  
chirurgicales entre les établissements  
publics et privés

# Instauration ou modification d'une antibiothérapie un jour donné

- Enquête prospective entre le 1<sup>er</sup> juin et le 30 septembre 2008
- Photographie un jour donné
- Tous les établissements MCO de la région Haute Normandie
- Pour tout patient hospitalisé en MCO



**INSTAURATION OU MODIFICATION ¶  
D'UNE ANTIBIOTHERAPIE CE JOUR¶  
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR¶**

¶

▪ **ENTREE¶**

Nom établissement : ..... Spécialité du service : .....¶

Date de l'enquête : .../.../2008¶

¶ Patient : Nom (N) : ..... Prénom (PP) : ..... Poids (même approximatif) : .....¶

date de naissance : .../.../... sexe : F / M¶

¶ Prescripteur :  médecin thésé  interne (sans l'avis d'un senior)¶

¶

**SITUATION PRECISE MOTIVANT L'ANTIBIOTHERAPIE¶**

▪ **Modalités du choix ¶**

Prescription:  de mémoire  après consultation d'1 référentiel si oui : lequel ? .....¶

Et sous quelle forme ?  papier  intranet  internet  autre : .....¶

Consultation d'un collègue :  oui  non ¶

si oui :  du service  de l'établissement  externe à l'établissement¶

microbiologiste  infectiologue  pharmacien  autre : .....¶

▪ ¶

▪ **Comorbidités¶**

Immunodéprimé (corticoïdes, radio, chimio...)  Insuffisant rénal¶

¶





**GENERALITES**

# Nombre de patients concernés par l'enquête

	Etablissements publics		Etablissements privés	
Nombre d'hommes	33	40%	36	47%
Nombre de femmes	50	60%	38	53%
NP	4		1 NP	
Age moyen	52 ans		52 ans	
Médiane	54 ans		54 ans	

# Prescripteurs & Prescriptions



		Établissements publics		Établissements privés	
Prescripteurs	Médecins thésés	78		75	
	Internes	4		0	
		5 NP			
Prescriptions	- de mémoire	54	62%	33	45,2%
	- avec un référentiel	27	38%	40	54,8%
		6 NP		2 NP	
Avis d'un collègue		0		0	

# Co morbidité

	Établissements publics	Établissements privés
Insuffisance rénale	3	0
Immunodépression	2	4





# LES DIFFERENTS ANTIBIOTIQUES PRESCRITS





# Prescription des antibiotiques : répartition par famille

## ETABLISSEMENTS PUBLICS



## ETABLISSEMENTS PRIVES



# Les antibiotiques les plus prescrits

- Établissements publics

- Céphalosporines : C1G (42%), C2G (24%) et C3G (5%)
- Aminopénicillines : 10%
- Aminosides : 7%

- Établissements privés

- Céphalosporines : C1G (43%), C2G (20%) et C3G (4%)
- Aminopénicillines : 10%
- Nitroimidazoles : 6%

	Etablissements publics	Etablissements privés	Total
	Prophylaxie chirurgicale	Prophylaxie chirurgicale	
Aminopénicillines	9	8	17
C1G	39	35	74
C2G	22	16	38
C3G	5	3	8
Aminosides	7	3	10
Fluoroquinolones	4	4	8
Lincosamides	4	0	4
Nitroimidazoles	0	5	5
Tétracyclines	3	0	3
NP	1	5	6

# Indications en fonction du type d'antibiotique prescrit

- Etablissements publics

- Fluoroquinolones :
  - ophtalmologie (1)
  - urologie (1)
  - médecine générale polyvalente (1)
  - chirurgie viscérale et digestive : cholécystectomie (1)
- Tétracyclines : antibioprophylaxie dans un contexte d'IVG par aspiration (4)
- Lincosamides :
  - chirurgie générale polyvalente (2)
  - chirurgie viscérale et digestive : cholécystectomie (1)
  - obstétrique : césarienne (1)

# Indications en fonction du type d'antibiotique prescrit

- Etablissements privés
  - Fluoroquinolones :
    - chirurgie générale polyvalente : chirurgie urologique (4)
  - Lincosamides :
    - chirurgie générale polyvalente (2)
  - Nitroimidazoles :
    - chirurgie viscérale et digestive (3) dont une fistule anale

The image features six circles of varying shades of purple and lavender. Two circles are solid, and four are hollow with a thin outline. They are arranged in two rows: three in the top row and three in the bottom row. The word "ASSOCIATIONS" is centered over the top row of circles.

# ASSOCIATIONS


# Nombre d'antibiotique par patients

	Etablissements publics		Etablissements privés	
1 antibiotique	82	94%	65	93%
2 antibiotiques	4	5%	4	6%
3 antibiotiques	1	1%	1	1%
Non Précisé (NP)	0		5	
Moyenne	1,06		1,08	



The image features a central text element surrounded by six decorative circles. Three circles are arranged in a horizontal row above the text, and three are arranged in a horizontal row below it. The top row consists of an empty circle on the left, a solid purple circle in the middle, and another solid purple circle on the right. The bottom row consists of a solid purple circle on the left, a solid purple circle in the middle, and an empty circle on the right. The text 'VOIE D'ADMINISTRATION' is centered horizontally and overlaps with the middle circles of both rows.

**VOIE D'ADMINISTRATION**



Etablissements publics

Etablissements privés

OC\* : voie oculaire utilisée en ophtalmologie